



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 603 00 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Ing. Jana Ondráčková / 545 110 470

E-mail: jana.ondrackova@ukzuz.gov.cz

Datum: 30. 1. 2026

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 1. 2026 – 31. 1. 2026

1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

Axial 45 EC

držitel rozhodnutí o povolení: Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH-4058
Basel, Švýcarsko

evidenční číslo: 6112-0

účinná látka: pinoxaden 45 g/l

safener Klochintocet 7,96 g/l (ve formě Klochintocet-mexyl 11,25 g/l)

platnost povolení končí dne: 30.6.2027

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
ječmen jarní	oves hluchý	0,67 l/ha	AT	1) od 21 BBCH, do 31 BBCH 2) od 12 BBCH, do 31 BBCH	5) pole
pšenice	chundelka metlice, oves hluchý	0,67-1 l/ha	AT	1) od 21 BBCH, do 39 BBCH, na jaře 2) od 12 BBCH, do 31 BBCH	5) pole
ječmen, žito, tritikale	chundelka metlice, oves hluchý	1 l/ha	AT	1) od 21 BBCH, do 39 BBCH, na jaře 2) od 12 BBCH, do 31 BBCH	5) pole

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
ječmen, pšenice, tritikale, žito	200-400 l/ha	postřik	1x

Spektrum účinnosti:

Citlivé plevy: chundelka metlice, oves hluchý

Případnou citlivost odrůd ječmene konzultujte s držitelem povolení.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Následné plodiny – v normálním osevním postupu po sklizni obilniny lze pěstovat jakoukoli plodinu.

Náhradní plodiny – kukuřici, oves a jílky lze vysévat nejdříve za 4 týdny po aplikaci. Ostatní plodiny lze pěstovat bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou oves, kukuřice a jílky.

Okamžitě po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení.

Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou, dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu lidského zdraví

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel [m]				
ječmen, pšenice, tritikale, žito	5	5	5	5

Neodif

držitel rozhodnutí o povolení: Indofil Industries (Netherlands) B.V., Jollemanhof 22, 1019
GW Amsterdam, Nizozemí

evidenční číslo: 6011-0

účinná látka: difenokonazol 250 g/l

platnost povolení končí dne: 31.1.2029

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
rajče	hnědá skvrnitost rajčat, padlí rajčete	0,5 l/ha	3	1) od: 19 BBCH	5) skleníky
baklažán	hnědá skvrnitost baklažánu, padlí baklažánu	0,5 l/ha	3	1) od: 19 BBCH	5) skleníky
okurka	padlí okurky, alternáriová hniloba	0,5 l/ha	3	1) od: 59 BBCH, do: 61 BBCH	5) skleníky

Plodina	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
baklažán, rajče	200-1200 l/ha	postřik	3x	7 dnů
okurka	200-1000 l/ha	postřik	3x	8-10 dnů

Skleník je definován nařízením (ES) č. 1107/2009.

Observer Pro

držitel rozhodnutí o povolení: GLOBACHEM nv., Lichtenberglaan 2019, Brustem
Industriepark, B-3800 Sint-Truiden, Belgie

evidenční číslo: 6138-0

účinná látka: propamokarb 377,1 g/l (ve formě propamokarb-hydrochloridu 450 g/l)
zoxamid 67,5 g/l

platnost povolení končí dne: 31.1.2028

Rozsah povoleného použití

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
brambor	plíseň bramboru	2 l/ha	7	1) od: 21 BBCH, do: 79 BBCH	5) pole

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
brambor	150 - 300 l/ha	postřik	3x	7 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina, oblast použití	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
brambor	9	4	4	4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu zdraví lidí

Plodina, oblast použití	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel [m]				
brambor	5	5	5	5

Porafam

držitel rozhodnutí o povolení: Adama CZ s.r.o., Pražská 636, 25241 Dolní Břežany

evidenční číslo: 6065-0

účinná látka: aminopyralid 240 g/l

platnost povolení končí dne: 31.8.2028

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
řepka olejka ozimá	plevele dvouděložné jednoleté	0,025 l/ha	AT	1) od 00 BBCH, do 09 BBCH 2) preemergentně	5) pole
řepka olejka ozimá	plevele dvouděložné jednoleté	0,033 l/ha	AT	1) od 10 BBCH, do 18 BBCH 2) od 10 BBCH, do 14 BBCH	5) pole

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
řepka olejka ozimá	200-400 l/ha	postřik	1x na podzim

Spektrum plevelů

Preemergentní aplikace

0,025 l/ha

Plevelé citlivé: heřmánkovec nevonný, mák vlčí

Plevelé méně citlivé: heřmánek pravý, merlík bílý, chrpa modrá

Postemergentní aplikace

0,033 l/ha

Plevelé citlivé: heřmánek pravý, heřmánkovec nevonný, mák vlčí

Plevelé méně citlivé: merlík bílý, chrpa modrá, violka rolní, hluchavka nachová

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny

Lze pěstovat cukrovku, brambor, pelušku, slunečnici, bob, mrkev, ječmen jarní, kukuřici, pšenici ozimou. Před jejich pěstováním proveďte orbu.

Náhradní plodiny

Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Po ošetření plodiny přípravkem mohou zůstat po sklizni v půdě a rostlinných zbytcích rezidua přípravku. K urychlení odbourávání těchto reziduí je třeba rostlinné zbytky rozřezat a co nejdříve po sklizni zapravit.

Rezidua účinných látek v rostlinných zbytcích, které nejsou zcela rozloženy, mohou poškodit citlivé následné plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel.

V blízkosti citlivých plodin ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětrí, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Čištění aplikačního zařízení:

Okamžitě po skončení postřiku úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž ramena a trysky 3x čistou vodou o objemu 10 % objemu nádrže při prvním vyplachování a 20 % objemu nádrže při druhém a třetím vyplachování. Po každém vypláchnutí nádrž vyprázdněte. Trysky a sítko musejí být čištěny odděleně.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Porafam Titan

držitel rozhodnutí o povolení: Adama CZ s.r.o., Pražská 636, 25241 Dolní Břežany

evidenční číslo: 6067-0

účinná látka: aminopyralid 15 g/l

chinmerak 470 g/l

platnost povolení končí dne: 31.12.2027

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
řepka olejka ozimá	plevele dvouděložné jednoleté	0,5 l/ha	AT	1) od: 00 BBCH, do: 09 BBCH 2) preemergentně	5) pole
řepka olejka ozimá	plevele dvouděložné jednoleté	0,5 l/ha	AT	1) od: 10 BBCH, do: 18 BBCH 2) od: 10 BBCH, do: 14 BBCH	5) pole

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
řepka olejka ozimá	200-400 l/ha	postřik	1 x na podzim

Spektrum plevelů

Preemergentní aplikace:

Plevelé citlivé: chrpa modrá, svízel přitula, heřmánek pravý, heřmánkovec nevonný, mák vlčí

Plevelé méně citlivé: merlík bílý, zemědělský lékařský, hluchavka nachová, violka rolní

Postemergentní aplikace:

Plevelé citlivé: chrpa modrá, svízel přitula, hluchavka nachová, mák vlčí

Plevele méně citlivé: merlík bílý, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, bažanka roční, pomněnka rolní, hulevník lékařský, violka rolní

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Nelze vyloučit projevy fyto toxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Lze pěstovat cukrovku, brambor, slunečnici, pšenici ozimou, ječmen jarní, žito a kukuřici. Před jejich pěstováním proveďte orbu.

Náhradní plodiny: Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Po ošetření plodiny přípravkem mohou zůstat po sklizni v půdě a rostlinných zbytcích rezidua přípravku. K urychlení odbourávání těchto reziduí je třeba rostlinné zbytky rozřezat a co nejdříve po sklizni zapravit.

Rezidua účinných látek v rostlinných zbytcích, které nejsou zcela rozloženy, mohou poškodit citlivé následné plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel.

V blízkosti citlivých plodin ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětrí, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Čištění aplikačního zařízení:

Okamžitě po skončení postřiku úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou. Po každém kroku se ujistěte, že byla odstraněna veškerá kapalina z nádrže postřikovače, čerpadla a hadic. Trysky a sítko musejí být čistištěm odděleny.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Telaron Supra

držitel rozhodnutí o povolení: UPL Holdings Coöperatief U.A., Claudius Prinsenlaan 144 A,
Blok A, 4818 CP Breda, Nizozemí

evidenční číslo: 6259-0

účinná látka: prothiokonazol 50 g/l

síra 625 g/l

platnost povolení končí dne: 31.7.2027

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
pšenice ozimá, tritikale ozimé	braničnatka pšeničná, rez plevová, rez pšeničná	4 l/ha	35	1) od 30 BBCH, do 69 BBCH	5) pole
žito ozimé	rez žitná	4 l/ha	35	1) od 30 BBCH, do 69 BBCH	5) pole

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé	100-400 l/ha	postřik	2x	14 dnů

Neošetřujte při intenzivním slunečním svitu a vysokých teplotách.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé	4	4	4	4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

2. NOVÉ POVOLENÉ POMOCNÉ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN

Slimakill

držitel rozhodnutí o povolení: INEF BioP s.r.o., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice

evidenční číslo: 1869-0B

účinná látka: *Pellioditis hermaphrodita*

platnost povolení končí dne: 13.1.2036

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
okrasné rostliny, zelenina, ovocné plodiny	plzáci, slimáčky	12 mil. jedinců/40 m ²	-	2) kurativně	5) venkovní prostory, chráněné prostory
okrasné rostliny, zelenina, ovocné plodiny	plzáci, slimáčky	12 mil. jedinců/60-80 m ²	-	2) preventivně	5) venkovní prostory, chráněné prostory
okrasné rostliny, zelenina, ovocné plodiny	plzáci, slimáčky	30 mil. jedinců/100 m ²	-	2) kurativně	5) venkovní prostory, chráněné prostory
okrasné rostliny, zelenina, ovocné plodiny	plzáci, slimáčky	30 mil. jedinců/150-200 m ²	-	2) preventivně	5) venkovní prostory, chráněné prostory

(–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit.

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
okrasné rostliny, ovocné plodiny, zelenina	rozhoz	bez omezení	28 dnů

Upřesnění použití:

Aplikujte na mírně vlhkou půdu, nejlépe ve večerních hodinách nebo podmračeném počasí. Zapravte do půdy 1 až 5 cm hluboko a zalijte přiměřeným množstvím vody. Teplota při aplikaci by neměla klesnout pod +5 °C ani překročit +25 °C. Po aplikaci udržujte půdu mírně vlhkou alespoň dva týdny.

Neaplikujte za vysokých teplot, přímého slunečního záření a do suché půdy, neboť může dojít k úhynu hlístic a snížení účinnosti.

3. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU

Boxer (+ další obchodní jméno Piroseo, Auros, Filon)

držitel rozhodnutí o povolení: Syngenta Limited, Jealott's Hill International Research Centre,
Bracknell, Berkshire, RG42 6EY, Spojené království

evidenční číslo: 4566-0

účinná látka: prosulfokarb 800 g/l

platnost povolení končí dne: 31.1.2028

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
brambor	plevele dvouděložné jednoleté	5 l/ha	AT	1) preemergentně	5) pole
hrách setý	plevele dvouděložné jednoleté	5 l/ha	AT	1) preemergentně	5) pole
slunečnice roční	plevele dvouděložné jednoleté	5 l/ha	AT	1) preemergentně	5) pole
pšenice ozimá	plevele dvouděložné jednoleté, chundelka metlice, lipnice roční	3 l/ha	AT	1) preemergentně do 3 dnů po zasetí, ve f. 00 BBCH	5) pole
pšenice ozimá	plevele dvouděložné jednoleté, chundelka metlice, lipnice roční	3 l/ha	AT	1) postemergentně, od: 11 BBCH, do: 13 BBCH	
ječmen ozimý	plevele dvouděložné jednoleté, chundelka metlice, lipnice roční	3 l/ha	AT	1) preemergentně do 3 dnů po zasetí, ve f. 00 BBCH	
ječmen ozimý	plevele dvouděložné jednoleté, chundelka metlice, lipnice roční	3 l/ha	AT	1) postemergentně, od: 11 BBCH, do: 13 BBCH	
žito ozimé	plevele dvouděložné jednoleté, chundelka metlice, lipnice roční	3 l/ha	AT	1) preemergentně do 3 dnů po zasetí, ve f. 00 BBCH	
žito ozimé	plevele dvouděložné	3 l/ha	AT	1) postemergentně,	

	jednoleté, chundelka metlice, lipnice roční			od: 11 BBCH, do: 13 BBCH	
tritikale ozimé	plevele dvouděložné jednoleté, chundelka metlice, lipnice roční	3 l/ha	AT	1) preemergentně do 3 dnů po zasetí, ve f. 00 BBCH	
tritikale ozimé	plevele dvouděložné jednoleté, chundelka metlice, lipnice roční	3 l/ha	AT	1) postemergentně, od: 11 BBCH, do: 13 BBCH	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
brambor, hrách setý, slunečnice roční	300-400 l/ha	postřik	1x
ječmen, pšenice, tritikale, žito	200-300 l/ha	postřik	1x

Dávka 5 l/ha

Citlivé plevle:

heřmánkovité plevle, hluchavka nachová, chundelka metlice, kokoška pastuší tobolka, kolenec rolní, konopice napuchlá, laskavce, merlíky, opletka obecná, penízek rolní, pět'our malolůbný, ptačinec žabinec, rozrazil, ředkev ohnice, svízel přitula

Méně citlivé plevle:

heřmánkovec přímořský, výdrol řepky, rdesno blešní, ježatka kuří noha, violky

Dávka 3 l/ha

Citlivé plevle:

svízel přitula, ptačinec žabinec, rozrazil, chundelka metlice, hluchavka nachová, merlík bílý

Méně citlivé plevle:

mák vlčí, opletka obecná, violka rolní, heřmánek pravý, lipnice roční

Použití přípravku k ošetření ozimých obilnin:

Přípravek se aplikuje preemergentně do 3 dnů po zasetí nebo časně postemergentně.

Přípravek účinkuje spolehlivě pouze na plevle vzešlé na podzim v době aplikace nebo krátce po ní.

Růstová fáze dvouděložných plevelů při aplikaci: 1-2 listy, maximálně 3 listy (BBCH 11-13)

Růstová fáze chundelky metlice při aplikaci: 1-2 listy (BBCH 11-12)

U pšenice ozimé při preemergentní aplikaci nelze vyloučit fytotoxicitu v podobě přechodného zbrzdění růstu.

Při použití přípravku nelze vyloučit nepříznivý vliv na jakost ošetřených rostlin a/nebo rostlinných produktů!

Neaplikujte za podmínek nepříznivých pro vzcházení a vývoj rostlin a pokud se očekávají intenzivní srážky krátce po aplikaci.

Použití přípravku k ošetření brambor, hrachu setého a slunečnice roční:

Hloubka setí hrachu setého musí být minimálně 5 cm, slunečnice roční 3-5 cm.

Je třeba vždy dodržet hloubku setí. Zejména u hrachu se může vyskytnout fytoxicita v podobě zpožděného vzcházení a retardace růstu.

Nelze vyloučit nepříznivý vliv přípravku na velikost a kvalitu výnosu hrachu.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Náhradní plodiny:

V případě, že došlo k zaorávce plodiny ošetřené přípravkem, lze po provedené orbě pěstovat kukuřici.

Při zaorávce pšenice na jaře lze pěstovat jarní obilniny, kukuřici, brambory, hrách nebo slunečnici.

Následné plodiny:

V témže roce na podzim lze jako následné plodiny pěstovat po orbě ozimé obilniny nebo řepku olejku.

Následné plodiny pěstované v následujícím roce na jaře lze pěstovat bez omezení, kromě fazolu.

Při aplikaci do ozimých obilnin lze pěstovat následné plodiny bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé	5	4	4	4
brambor, hrách, slunečnice	8	6	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
brambor, hrách, slunečnice	5	0	0	0

Pro aplikaci do pšenice ozimé, ječmene ozimého, žita ozimého, tritikale ozimého:

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Pro aplikaci do brambor:

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích

aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Pro aplikaci do hrachu:

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Pro aplikaci do slunečnice:

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu zdraví lidí

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel [m]				
brambor, hrách setý, slunečnice roční, ječmen, pšenice, tritikale, žito	nelze	nelze	nelze	5

Enervin Pro

držitel rozhodnutí o povolení: BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen,
Německo

evidenční číslo: 5877-0

účinná látka: ametoktradin 75 g/l

fosfonáty draselné 453 g/l

platnost povolení končí dne: 31.12.2026

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
réva	plíseň révy	4,2 l/ha	35	1) od: 70 BBCH, do: 83 BBCH	4) 3,2 L/ 10 000 m ² LWA 5) venkovní prostory
brambor	plíseň bramboru	3,2 l/ha	7	1) od: 21 BBCH, do: 89 BBCH	5) pole
okurka, cuketa	plíseň okurky	3,2 l/ha	1	1) od: 29 BBCH, do: 89 BBCH	5) skleníky
rajče, baklažán	plíseň bramboru	3,2 l/ha	1	1) od: 21 BBCH, do: 89 BBCH	5) skleníky

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
réva	500 – 1200 l/ha	postřik, rosení	2x za rok	10 – 14 dnů
brambor	200 – 500 l/ha	postřik	2x	5 – 10 dnů
okurka, cuketa, rajče, baklažán	100 – 1500 l/ha	postřik	2x	7 – 10 dnů

$LWA = (\text{ošetřená výška keře} \times 2 \times 10\,000) / \text{šířka meziřadí}$

Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Skleník je definován nařízením (ES) č. 1107/2009.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
réva	10	6	6	6
brambor	4	4	4	4

Réva:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Korvetto

držitel rozhodnutí o povolení: Corteva Agriscience Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00
Praha 5

evidenční číslo: 5505-1

účinná látka: halauxifen- methyl 5 g/l

klopyralid 120 g/l

platnost povolení končí dne: 5.8.2026

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
řepka olejka ozimá	plevele dvouděložné	1 l/ha	AT	1) na jaře, od: 30 BBCH, do: 50 BBCH	5) pole

louky a pastviny	pcháč oset, pryskyřník plazivý, pampeliška lékařská	1,67 l/ha	7	1) od března do července	5) venkovní prostory
trávníky	pcháč oset, pryskyřník plazivý, pampeliška lékařská	1,67 l/ha	7	1) od března do července	5) venkovní prostory

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a zkrmováním nebo vstupem domácích zvířat, která požírají nebo olizují travní porost.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
řepka olejka ozimá	100-300 l/ha	postřik	1x
louky a pastviny, trávníky	200-400 l/ha	postřik	1x za rok

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé:

hluchavka nachová, chrpa polní, svízel přitula, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, kakost maličkový, kakost dlanitosečný, mák vlčí, pcháč oset, rmen rolní, starček obecný, zemědělský lékařský, pryskyřník plazivý (v dávce 1,67 l/ha), pampeliška lékařská (v dávce 1,67 l/ha)

Plevele méně citlivé:

kakost měkký, úhorník mnohodílný

Pokyny pro aplikaci:

Řepka olejka ozimá

Přípravek se aplikuje v řepce ozimé na jaře v růstové fázi kulturní plodiny BBCH 30-50 (počátek prodlužovacího růstu až hlavní květenství viditelné, těsně obklopené nejvyššími listy). Hubí pouze vzešlé plevle. Optimální účinnosti se dosáhne při aplikaci na aktivně rostoucí plevle. Déletrvající sucho po aplikaci může způsobit mírné snížení účinnosti.

Přípravek nepůsobí na trávovité plevle.

Nižší dávka vody je určena na plevle v nižších růstových fázích a při nižší pokryvnosti kulturní plodinou. Při pozdějších aplikacích se použije 200-300 l vody na ha.

Louky a pastviny, trávníky

Přípravek se aplikuje na loukách, pastvinách a trávnících postemergentně v termínu od března do července na aktivně rostoucí plevle. Aplikace se provádí na porosty starší jednoho roku. Nižší dávka vody je určena na plevle v nižších růstových fázích a při nižší pokryvnosti kulturní plodinou. Při vysoké pokryvnosti kulturní plodinou (trávou) je nutné použít vyšší dávku vody 300-400 l/ha. Neaplikujete na porosty s cílenou příměsí jetelovin a luskovin, které přípravek hubí či silně retarduje. Pro maximální translokaci přípravku nesekejte porost po dobu 3-4 týdnů po aplikaci.

Hubí pouze vzešlé plevle. Optimální účinnosti se dosáhne při aplikaci na aktivně rostoucí plevle, pcháč oset do výšky 30 cm, pampelišky max. BBCH 59, pryskyřník plazivý

max. BBCH 59.

Déletrvající sucho po aplikaci může způsobit mírné snížení účinnosti. Přípravek nepůsobí na trávovité plevele.

Přípravek je odolný dešti 1 hodinu po aplikaci v řepce ozimé a 4 hodiny po aplikaci v loukách a pastvinách a trávnících.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Po aplikaci nelze vyloučit mírnou krátkodobou růstovou inhibici řepky olejky (v délce trvání 2-3 týdnů). Tyto projevy nemají vliv na výši a kvalitu sklizně.

Před ošetřením okrasných a účelových trávníků ověřte citlivost na menším počtu rostlin/ menší ploše.

Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty!

Obzvláště citlivé jsou brambory, bobovité a miříkovité rostliny, réva vinná a chmel. V blízkosti citlivých plodin ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětrí, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Řepka olejka ozimá

Náhradní plodiny:

V případě zaorávky ozimé řepky ošetřené na jaře přípravkem (za podmínky promísení půdního profilu do hloubky minimálně 20 cm a uplynutí min. 30 dnů od aplikace) může být jako náhradní plodina zvolena jarní řepka olejka, jarní obilniny, len nebo kukuřice.

Následné plodiny:

Po sklizni řepky ozimé ošetřené přípravkem na jaře může být v rámci osevního postupu vyseta jakákoliv plodina.

Louky, pastviny a trávníky

Kukuřice nebo ozimá řepka mohou být vysévány bez omezení.

Cukrovka nebo krmná řepa mohou být vysévány bezprostředně po zaorávce porostu nebo po uplynutí 50 dnů od aplikace v případě bezorebného setí.

Obilniny mohou být vysévány bezprostředně po zaorávce porostu nebo po uplynutí 75 dnů od aplikace v případě bezorebného setí.

Bob může být vyséván bezprostředně po zaorávce porostu nebo po uplynutí 100 dnů od aplikace v případě bezorebného setí.

Plodiny z čeledí složnokvětých nebo směsky s těmito plodinami např. slunečnice by neměly být vysévány dříve než 75 dnů od aplikace v případě orby nebo 200 dnů od aplikace v případě bezorebného setí.

Rezidua účinných látek v rostlinných zbytcích, které nejsou zcela rozloženy, mohou poškodit citlivé následné plodiny (luskoviny, slunečnice, brambor, mrkev, salát).

Rostlinná hmota ošetřená přípravkem nemůže být využita pro kompostování.

Čištění postřikovače:

- Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).
- Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3 % roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.
- Opakujte postup podle bodu "2)" ještě dvakrát.
- Trysky a sítko musí být čištěny odděleně před zahájením a po skončení proplachování.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
řepka olejka ozimá	4	4	4	4
louky a pastviny, travníky	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
řepka olejka ozimá	5	0	0	0
louky a pastviny, travníky	5	5	0	0

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu zdraví lidí

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel [m]				
řepka olejka ozimá	3	3	3	3

Major 300 SL

držitel rozhodnutí o povolení: INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa,
Polsko

evidenční číslo: 5546-0

účinná látka: klopýralid 300 g/l

platnost povolení končí dne: 30.9.2037

Rozsah povoleného použití

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
pšenice ozimá	plevele dvouděložné	0,3-0,4 l/ha	AT	1) od: 21 BBCH, do: 29 BBCH, na jaře	5) pole
cukrovka	plevele dvouděložné	0,3-0,4 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 14 BBCH	5) pole
cukrovka	plevele dvouděložné	3 x 0,2 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 14 BBCH	4) aplikace dělená 5) pole

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
cukrovka	200-300 l/ha	postřik	1x nebo dělená aplikace	6-10 dnů
pšenice ozimá	200-300 l/ha	postřik	1x	

Přípravek nejefektivněji ničí mladé, intenzívně rostoucí plevle od fáze 2–3 pravých listů do fáze max. 6 pravých listů; pcháč optimálně ve fázi přízemní listové růžice; heřmánkovité plevle ve fázi malé listové růžice.

Pšenice ozimá

Přípravek aplikovaný samostatně v dávce 0,3-0,4 l/ha

Citlivé plevle: heřmánek nevonný, lilek černý, rmen rolní, heřmánek pravý, pět'our maloúborný

Středně citlivé plevle: pcháč rolní.

Cukrová řepa

Přípravek aplikovaný samostatně v dávce 0,3-0,4 l/ha nebo v dávce 3 x 0,2 l/ha

Citlivé plevle: chrpa polní, pcháč rolní, heřmánek pravý, heřmánek nevonný, opletka obecná, rmen rolní, pět'our maloúborný.

Dělená aplikace: První ošetření proveďte ve fázi 2–4 pravých listů cukrovky (BBCH 12-14) a následná ošetření při dalším vzcházení plevelů.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětrí, nižší teploty). Za

vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Následné plodiny

Po sklizni rostlin ošetřených přípravkem ve stejné vegetační sezoně nevysévejte luštěniny (hrách, fazole, vikev, vojtěška atd.) a lilkovité (brambory, rajče atd.)

Mezi následně pěstovanými plodinami na podzim stejného kalendářního roku mohou být obilniny, řepka nebo trávy.

V případě nutnosti předčasné likvidace porostu ošetřeného přípravkem lze na stejném poli pěstovat: řepku, obilniny, cukrovou řepu, kukuřici nebo trávy.

Veškeré zbytky ošetřených plodin co nejdříve po sklizni rozřezejte a zapravte do půdy, kde se rostlinné zbytky a rezidua přípravku rychleji rozloží.

Rezidua přípravku v rostlinných pletivech (včetně hnoje), která nejsou zcela rozložena, mohou poškodit citlivé následné plodiny (luskoviny, mrkev, brambory, salát, rajčata).

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
pšenice ozimá, cukrovka	10	5	5	0

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu zdraví lidí

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel [m]				
pšenice ozimá, cukrovka	3	3	3	3

4. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ POMOCNÉHO PROSTŘEDKU

Sufy

držitel rozhodnutí o povolení: MONAS Technology s.r.o., Plav 122, 370 07 České
Budějovice 7

evidenční číslo: 1861-0C

účinná látka: zeolit 100 %

platnost povolení končí dne: 13.4.2033

Rozsah povoleného použití pomocného prostředku:

Profesionální použití

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
všechny plodiny	zvýšení odolnosti rostlin	3-3,5 kg/ha nebo 3,5 kg/ha LWA	1	2) mšice, svilušky při výskytu	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
všechny plodiny	200-1000 l/ha (chmel 4000 l/ha)	postřik, rosení	2x	14 dnů

Pro sady, chmelnice, vinice přepočítat plošnou hektarovou dávku na hektar postřikované listové plochy (ha LWA).

$LWA = (\text{ošetřená výška koruny} \times 2 \times 10\,000) / \text{šířka meziřadí}$

Při úpravě dávky přípravku podle LWA sadu/chmelnice/vinice se zároveň úměrně upravuje dávka vody.

Množství vody: - 200 l/ha pro polní plodiny,
- 1000 l/ha v sadech,
- 4000 l/ha pro chmel.

Vždy použít povolené smáčedlo.

Neprofesionální použití

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
všechny plodiny	zvýšení odolnosti rostlin	35 g/100 m ² 2-10 l vody/100 m ²	1	2) mšice, svilušky při výskytu	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
všechny plodiny	2-10 l/100 m ² (chmel 40 l/100 m ²)	postřik, rosení	2x	14 dnů

Vždy použít povolené smáčedlo.

5. ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ POVOLENÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ZMĚNA V ROZŠÍŘENÉM POUŽITÍ PŘÍPRAVKU tzv. „minority“ (= menšinová použití)

nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

(nařízení vydané pro referenční přípravek platí ve stejném rozsahu i pro všechna jeho další obchodní jména)

Delan Pro (malobalení)

evidenční číslo: 5447-1

účinná látka: dithianon 125 g/l

fosfonáty draselné 561 g/l

platnost povolení končí dne: 31.1.2027

Rozsah povoleného použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
rybíz, angrešt	antraknóza rybízu, rez vejmutovková	25 ml/100 m ² 1,5-5 l vody /100 m ²	8	1) od: prvních listů plně oddělených, do: fáze pokročilého zrání	4) max. 2x za rok 5) venkovní prostory
rybíz, angrešt	antraknóza rybízu, rez vejmutovková	25 ml/100 m ² 1,5-5 l vody /100 m ²	AT	1) od: ukončení růstu letorostů, do: 50 % listů zbarveno, po sklizni	4) max. 1x za rok 5) venkovní prostory

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je třeba dodržet mezi termínem aplikace a sklizní

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
rybíz, angrešt	postřik, rosení	3x za rok	7-10 dnů

Enervin Pro

evidenční číslo: 5877-0

účinná látka: ametoktradin 75 g/l

fosfonáty draselné 453 g/l

platnost povolení končí dne: 31.12.2026

Rozsah povoleného použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
pór	zasychání špiček listů póru	3,2 l/ha	7	1) od: 15 BBCH, do: 49 BBCH	5) venkovní prostory
cibule jarní	plíseň	3,2 l/ha	7	1) od: 15 BBCH, do: 49 BBCH	5) venkovní prostory 6) na nať
salát, čekanka, špenát, mangold, kozlíček polníček, kozlíček (<i>Valerianella eriocarpa</i>), rukola setá, křez, řeřicha setá, barborka obecná	plíseň	3,2 l/ha	7	1) od: 41 BBCH, do: 49 BBCH	5) venkovní prostory

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
pór, cibule jarní	100-1000 l/ha	postřik	1x	
salát, čekanka, špenát, mangold, kozlíček polníček, kozlíček (<i>Valerianella eriocarpa</i>), rukola setá, křez, řeřicha setá, barborka obecná	400-1000 l/ha	postřik	2x	7-10 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
pór, cibule jarní, salát, čekanka, špenát, mangold, kozlíček polníček, kozlíček (<i>Valerianella eriocarpa</i>), rukola setá, křez, řeřicha setá, barborka obecná	4	4	4	4

Stomp 400 SC

evidenční číslo: 3699-6

účinná látka: pendimethalin 400 g/l

platnost povolení končí dne: 15.1.2028

Rozsah povoleného použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
ostropestřec mariánský	plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté	3,5-4,5 l/ha	AT	1) preemergentně, postemergentně 2) preemergentně, postemergentně	5) venkovní prostory 6) všechna určení mimo výživu lidí a zvířat
lupina úzkolistá	plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté	3,3-4,1 l/ha	AT	1) preemergentně do 3 dnů po zasetí 2) preemergentně	5) venkovní prostory 6) pro výživu zvířat
okrasné školky, ovocné školky	plevele dvouděložné jednoleté, plevele lipnicovité	3,3-4,1 l/ha nebo 2,8 l/ha + 1,4 l/ha Outlook - TM	AT	1) mimo BBCH 40-49	5) venkovní prostory
salát	plevele dvouděložné jednoleté	2 l/ha	AT	1) před výsadbou 2) od: 11 BBCH, do: 12 BBCH	5) venkovní prostory
koriandr setý,	plevele	2,5-4 l/ha	AT	1) preemergentně	5) venkovní

fenykl plodový, světlice barvířská				2) preemergentně	prostory 6) semenné porosty
---	--	--	--	------------------	-----------------------------------

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
ostropestřec mariánský, lupina úzkolistá	400-600 l/ha	postřik	1x
okrasné školky, ovocné školky	400-600 l/ha	postřik	1x za rok
salát	200-1000 l/ha	postřik	1x
koriandr setý, fenykl plodový, světlice barvířská	300-500 l/ha	postřik	1x

Růstová fáze ostropestřce mariánského:

Preemergentně: před vzejitím

Postemergentně: BBCH 12-16

Růstová fáze plevelů:

Preemergentně: před vzejitím

Postemergentně: BBCH 11-12

Odstupňování dávek: podle intenzity zaplevelení

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	50 %	75 %	90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
ostropestřec mariánský	40	18	9	4
lupina úzkolistá, okrasné školky, ovocné školky	35	18	8	4
koriandr setý, fenykl plodový, světlice barvířská	35	16	8	4
salát	16	8	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
ostropestřec mariánský, lupina úzkolistá, okrasné školky, ovocné školky, koriandr setý, fenykl plodový, světlice barvířská	10	5	5	0
salát	5	5	0	0

Ostropestřec mariánský, lupina úzkolistá, okrasné školky, ovocné školky, koriandr setý, fenykl plodový, světlice barvířská:

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Salát:

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Trianum-P

evidenční číslo: 5798-0

účinná látka: *Trichoderma harzianum* kmen T-22 1 miliarda CFU/g

platnost povolení končí dne: 15.4.2026

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
zelenina kořenová	fuzariózy, rizoktoniová hniloba, pytiová hniloba, sklerotiniiová hniloba	1-2,5 kg/ha kultivace v řádcích 2,5-5 kg/ha kultivace v hrůbcích, plošně na poli	AT	1) ve f. 00 BBCH	5) venkovní prostory, chráněné prostory mimo skleníky
brambor, batáty	fuzariózy, rizoktoniová hniloba, pytiová hniloba, sklerotiniiová hniloba	2,5-5 kg/ha	AT	1) ve f. 00 BBCH	5) venkovní prostory, chráněné prostory mimo skleníky
zelenina cibulová, pór	fuzariózy, rizoktoniová hniloba, pytiová hniloba, sklerotiniiová hniloba	15 kg/ha první aplikace 7,5 kg/ha druhá aplikace	AT	1) ve f. 00 BBCH	5) venkovní prostory, chráněné prostory
zelenina cibulová, pór	fuzariózy, rizoktoniová hniloba, pytiová	1-2,5 kg/ha kultivace v řádcích 2,5-5 kg/ha	AT	1) od: 11 BBCH, do: 19 BBCH	5) venkovní prostory, chráněné

	hniloba, sklerotiniová hniloba	kultivace v hrůbcích, plošně na poli			prostory
řepa salátová	fuzariózy, rizoktoniová hniloba, pyťiová hniloba, sklerotiniová hniloba	1-2,5 kg/ha kultivace v řádcích 2,5-5 kg/ha kultivace v hrůbcích, plošně na poli	AT	1) ve f. 00 BBCH	5) venkovní prostory, chráněné prostory
cukrovka	fuzariózy, rizoktoniová hniloba, pyťiová hniloba, sklerotiniová hniloba	1-2,5 kg/ha kultivace v řádcích 2,5-5 kg/ha plošně na poli	AT	1) ve f. 00 BBCH	5) venkovní prostory
zelenina listová, zelenina brukvovitá	fuzariózy, rizoktoniová hniloba, pyťiová hniloba, sklerotiniová hniloba	1-2,5 kg/ha kultivace v řádcích 2,5-5 kg/ha kultivace v hrůbcích, plošně na poli	AT	1) ve f. 00 BBCH	5) venkovní prostory, chráněné prostory
zelenina řapíkatá, chřest, zelenina plodová	fuzariózy, rizoktoniová hniloba, pyťiová hniloba, sklerotiniová hniloba	1-2,5 kg/ha kultivace v řádcích 2,5-5 kg/ha kultivace v hrůbcích, plošně na poli	AT	1) od: 00 BBCH, do: 09 BBCH	5) venkovní prostory, chráněné prostory
luskoviny	fuzariózy, rizoktoniová hniloba, pyťiová hniloba, sklerotiniová hniloba	1-2,5 kg/ha kultivace v řádcích 2,5-5 kg/ha kultivace v hrůbcích, plošně na poli	AT	1) ve f. 00 BBCH	5) venkovní prostory
zelenina tykvovitá	fuzariózy, rizoktoniová hniloba, pyťiová hniloba, sklerotiniová hniloba	1-2,5 kg/ha kultivace v řádcích 2,5-5 kg/ha kultivace v hrůbcích, plošně na poli	AT	1) od: 00 BBCH, do: 99 BBCH	5) venkovní prostory, chráněné prostory mimo skleníky
bobulovité a drobné ovoce, jahodník	fuzariózy, rizoktoniová hniloba, pyťiová hniloba, sklerotiniová	1-2,5 kg/ha kultivace v řádcích 2,5-5 kg/ha kultivace v hrůbcích, plošně na poli	AT	1) od: 00 BBCH, do: 99 BBCH	5) venkovní prostory, chráněné prostory

	hniloba				
ovocné školky, okrasné školky	fuzariózy, rizoktoniová hniloba, pytiová hniloba, sklerotiniová hniloba	0,15-1 kg / 1000 rostlin	AT	1) od: 00 BBCH, do: 99 BBCH	4) 10000-40000 rostlin/ha 5) venkovní prostory, chráněné prostory mimo skleníky
okrasné rostliny do 50 cm, trvalky	fuzariózy, rizoktoniová hniloba, pytiová hniloba, sklerotiniová hniloba	1-2,5 kg/ha kultivace v řádcích 2,5-5 kg/ha kultivace v hrůbcích, plošně na poli	AT	1) od: 00 BBCH, do: 99 BBCH	5) venkovní prostory, chráněné prostory
kořeninové rostliny a koření, fenykl	fuzariózy, rizoktoniová hniloba, pytiová hniloba, sklerotiniová hniloba	1-2,5 kg/ha kultivace v řádcích 2,5-5 kg/ha kultivace v hrůbcích, plošně na poli	AT	1) od: 00 BBCH, do: 49 BBCH	5) venkovní prostory, chráněné prostory
množitelský materiál (vegetativní)	fuzariózy, rizoktoniová hniloba, pytiová hniloba, sklerotiniová hniloba	2,5-5 kg/ha	AT	1) od: 00 BBCH, do: 99 BBCH	5) venkovní prostory, chráněné prostory
trávníky	fuzariózy, rizoktoniová hniloba, pytiová hniloba, sklerotiniová hniloba	3 kg/ha první aplikace 1,5 kg/ha druhá a další aplikace	AT	1) od: 00 BBCH, do: 99 BBCH	5) venkovní prostory
chmel	verticiliové vadnutí chmele	2,5-5 kg/ha	AT	1) od: 25 BBCH, do: 35 BBCH	5) venkovní prostory

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
zelenina kořenová	50-1000 l/ha	postřik na půdu	1x	
brambor, batáty	50-800 l/ha	postřik na půdu	1x	
zelenina cibulová, pór	200-1300 l/ha	postřik na půdu	2x	14 dnů
řepa salátová,	50-800 l/ha	postřik na půdu	1x	

cukrovka				
zelenina listová, zelenina brukvovitá	200-800 l/ha	postřik na půdu	1x za pěstební cyklus; 3 cykly za rok	
zelenina řapíkatá, chřest, zelenina plodová	200-800 l/ha	postřik na půdu	1x	
luskoviny	200-800 l/ha	postřik na půdu	1x za pěstební cyklus; 2 cykly za rok	
zelenina tykvovitá	200-800 l/ha	postřik na půdu	1x	
bobulovité a drobné ovoce, jahodník	700-1600 l/ha	postřik na půdu	5x za rok	70 dnů
ovocné školky, okrasné školky	10000-25000 l/ha	zálivka	5x za rok	70 dnů
okrasné rostliny, trvalky	700-1600 l/ha	postřik na půdu	4x za rok	14 dnů
kořeninové rostliny a koření, fenykl	700-1600 l/ha	postřik na půdu	4x za rok	14 dnů
množitelský materiál (vegetativní)	200-1000 l/ha	postřik na půdu	5x za rok	70 dnů
travníky	5000-25000 l/ha	postřik na půdu	12x za rok	14 dnů
chmel	200-800 l/ha	postřik na půdu při nahrnování	1x za rok	

6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU NA MENŠINOVÁ POUŽITÍ FORMOU VZÁJEMNÉHO UZNÁVÁNÍ POUZE PRO VLASTNÍ POTŘEBU v souladu s ust. § 38b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Nebylo vydáno

7. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ ROSTLIN

- Nebylo vydáno